

1ª ERRATA DO FORMULÁRIO DE FITOTERÁPICOS 2ª EDIÇÃO (FFFB2 1Er)

<i>Item nº</i>	<i>Capítulo/ monografia</i>	<i>Texto publicado</i>	<i>Texto corrigido</i>	<i>Justificativa</i>
1	<i>Arnica montana</i> L. POMADA Fórmula 5	Tintura da flor a 10%	Tintura da flor a 10% ou a 20%	Descrição da fórmula inconsistente com as orientações para o preparo.
2	<i>Cynara scolymus</i> L. PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA Fórmula 2 (...) ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO	Folha fresca (...) Fórmula 2: preparar por infusão, durante 10 minutos, considerando a proporção indicada na fórmula. Utilizar folhas frescas rasuradas (EMA, 2018).	Folha seca (...) Fórmula 2: preparar por infusão, durante 10 minutos, considerando a proporção indicada na fórmula. Utilizar folhas secas rasuradas (EMA, 2018).	Correção de inconsistências na fórmula e nas orientações para o preparo, conforme referência adotada.
3	<i>Equisetum arvense</i> L. ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO	Fórmula 1: preparar por infusão ou decocção, durante 5 a 15 minutos, a planta inteira rasurada, considerando a proporção indicada na fórmula (WICHTL, 2004; EMA, 2016). Fórmula 2: preparar por decocção, durante 5 a 15 minutos, a planta inteira rasurada, considerando a proporção indicada na fórmula (EMA, 2016). Fórmula 3: preparar o extrato fluido da planta inteira rasurada, utilizando álcool etílico a 25%, seguindo a RDE 1:1 (EMA, 2016). Em razão do baixo teor alcoólico da formulação, é recomendada a utilização de conservantes. Fórmula 4: preparar o extrato fluido da planta inteira rasurada, utilizando álcool etílico a 31,5%, seguindo a RDE 1:4-5 (EMA, 2016). Em	Fórmula 1: preparar por infusão ou decocção, durante 5 a 15 minutos, a parte aérea estéril rasurada, considerando a proporção indicada na fórmula (WICHTL, 2004; EMA, 2016). Fórmula 2: preparar por decocção, durante 5 a 15 minutos, a parte aérea estéril rasurada, considerando a proporção indicada na fórmula (EMA, 2016). Fórmula 3: preparar o extrato fluido da parte aérea estéril rasurada, utilizando álcool etílico a 25%, seguindo a RDE 1:1 (EMA, 2016). Em razão do baixo teor alcoólico da formulação, é recomendada a utilização de conservantes. Fórmula 4: preparar o extrato fluido da parte aérea estéril rasurada, utilizando álcool etílico a 31,5%, seguindo a RDE 1:4-5 (EMA, 2016). Em razão do	Correção de inconsistências entre as fórmulas e as orientações para o preparo, conforme referência adotada.

1ª ERRATA DO FORMULÁRIO DE FITOTERÁPICOS 2ª EDIÇÃO (FFFB2 1Er)

<i>Item nº</i>	<i>Capítulo/ monografia</i>	<i>Texto publicado</i>	<i>Texto corrigido</i>	<i>Justificativa</i>
		<p>razão do baixo teor alcoólico da formulação, é recomendada a utilização de conservantes.</p> <p>Fórmula 5: selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder a formulação. Deve ser utilizada a droga vegetal rasurada (EMA, 2016).</p> <p>Fórmula 6: selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder à formulação. O extrato aquoso deve ser obtido seguindo a RDE 4-7:1 (EMA, 2016).</p> <p>Fórmula 7: selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder à formulação. Preparar o extrato utilizando álcool etílico a 70% , seguindo a RDE 7,5-10,5:1 (EMA, 2016).</p>	<p>baixo teor alcoólico da formulação, é recomendada a utilização de conservantes.</p> <p>Fórmula 5: selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder a formulação. Deve ser utilizada a parte aérea estéril rasurada (EMA, 2016).</p> <p>Fórmula 6: selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder à formulação. O extrato aquoso da parte aérea estéril deve ser obtido seguindo a RDE 4-7:1 (EMA, 2016).</p> <p>Fórmula 7: selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder à formulação. Preparar o extrato da parte aérea estéril utilizando álcool etílico a 70% , seguindo a RDE 7,5-10,5:1 (EMA, 2016).</p>	
4	<i>Leonurus cardiaca L.</i> ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO	<p>Fórmula 1: preparar por infusão, durante 10 minutos, utilizando folhas secas e rasuradas (WICHTL, 2004; EMA, 2010). (...)</p> <p>Fórmula 3: preparar o extrato fluido, a partir da planta inteira rasurada, utilizando álcool etílico a 25%, seguindo a RDE 1:1 (EMA, 2010). Em razão do baixo teor alcoólico da formulação, é recomendada a utilização de conservantes.</p> <p>Fórmula 4: selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder à formulação. Utilizar a planta inteira seca e pulverizada (EMA, 2010).</p>	<p>Fórmula 1: preparar por infusão, durante 10 minutos, utilizando parte aérea florida seca e rasurada (WICHTL, 2004; EMA, 2010). (...)</p> <p>Fórmula 3: preparar o extrato fluido, a partir da parte aérea florida rasurada, utilizando álcool etílico a 25%, seguindo a RDE 1:1 (EMA, 2010). Em razão do baixo teor alcoólico da formulação, é recomendada a utilização de conservantes.</p> <p>Fórmula 4: selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder à formulação. Utilizar a parte aérea florida seca e pulverizada (EMA, 2010).</p>	Descrição nas orientações para o preparo inconsistente com as fórmulas.

1ª ERRATA DO FORMULÁRIO DE FITOTERÁPICOS 2ª EDIÇÃO (FFFB2 1Er)

<i>Item nº</i>	<i>Capítulo/ monografia</i>	<i>Texto publicado</i>	<i>Texto corrigido</i>	<i>Justificativa</i>
5	<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek MODO DE USAR	Fórmula 1: tomar 150 mL do infuso , duas horas após o almoço e à noite, podendo ser administrado até quatro vezes ao dia (OGAVA, et. al., 2000).	Fórmula 1: tomar 150 mL do decocto , duas horas após o almoço e à noite, podendo ser administrado até quatro vezes ao dia (OGAVA, et. al., 2000).	Modo de usar inconsistente com as orientações para o preparo da fórmula.
6	<i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker ADVERTÊNCIAS	O uso é contraindicado durante a gestação, lactação e para menores de 18 anos , devido à falta de dados adequados que comprovem a segurança nessas situações. O uso da preparação de tintura é especialmente contraindicado para gestantes, lactantes, alcoolistas e diabéticos, em função do teor alcoólico na formulação.	O uso é contraindicado durante a gestação e lactação, devido à falta de dados adequados que comprovem a segurança nessas situações. O uso da preparação de tintura é especialmente contraindicado para gestantes, lactantes, alcoolistas, diabéticos e menores de 18 anos , em função do teor alcoólico na formulação.	Advertências inconsistente com a restrição de uso da fórmula 3.
7	<i>Passiflora incarnata</i> L. ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO	Fórmula 3: seguir as técnicas de secagem do material vegetal e preparo de tintura descritas em Informações gerais em Generalidades, usando a RDE de 1:1 (EMA, 2014)	Fórmula 3: seguir as técnicas de secagem do material vegetal e preparo de extrato fluido descritas em Informações gerais em Generalidades, usando a RDE de 1:1 (EMA, 2014)	Descrição nas orientações para o preparo inconsistente com a fórmula.
8	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO	Fórmula 2: preparar o extrato mole com álcool etílico a 60%, seguindo a RDE de 10-17:1 (EMA, 2018). Selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder à formulação.	Fórmula 2: preparar o extrato mole do fruto seco com álcool etílico a 60%, seguindo a RDE de 10-17:1 (EMA, 2018). Selecionar a cápsula conforme preconizado em Informações gerais em Generalidades e proceder à formulação.	Correção para inclusão da parte da planta a ser utilizada, conforme referência adotada.
9	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO	Fórmula 2: O extrato seco deve ser obtido com água seguindo a RDE 12,16:1 e deve conter, no mínimo, 22% de polifenóis. Levar a Fase A e a Fase B separadamente ao fogo até atingirem a temperatura de 85° C. Misturar as duas fases, vertendo a fase B sobre a fase A, e deixar esfriar. Envasar e etiquetar (PEREIRA, 2014).	Fórmula 2: O extrato seco deve ser obtido com água seguindo a RDE 12-16:1 e deve conter, no mínimo, 22% de polifenóis. Levar a Fase A e a Fase B separadamente ao fogo até atingirem a temperatura de 85° C. Misturar as duas fases, vertendo a fase B sobre a fase A, e deixar esfriar. Envasar e etiquetar (PEREIRA, 2014).	Correção de informação, conforme referência adotada.

1ª ERRATA DO FORMULÁRIO DE FITOTERÁPICOS 2ª EDIÇÃO (FFFB2 1Er)

<i>Item n°</i>	<i>Capítulo/ monografia</i>	<i>Texto publicado</i>	<i>Texto corrigido</i>	<i>Justificativa</i>
10	<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg. EXTRATO FLUIDO Fórmula 4	Álcool etílico 30% q.s.p	Álcool etílico 36% q.s.p	Descrição na fórmula inconsistente com as orientações para o preparo.
